

Ayuda para pagar la PrEP

La mayoría de los programas de seguro médico y Medicaid cubren la PrEP. Según la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la PrEP debe ser gratuita en casi todos los planes de seguro médico. Esto significa que no se le puede cobrar por su medicación de PrEP ni por las visitas clínicas y los análisis de laboratorio que necesita para seguir tomando la PrEP.



Algunos estados ofrecen ayuda para pagar la PrEP, las visitas clínicas o los análisis de laboratorio si no tienes seguro:

» <https://nastad.org/prepcost-resources/prep-assistance-programs>

Otros programas que puedes consultar:

¡Preparados, listos, PrEP!

(Si no tienes seguro médico ni cobertura de Medicaid)

» <https://readysetprep.hiv.gov/>

» O llama al: **855-447-8410**

Para Truvada® y Descovy®

(Si no tienes seguro médico)

» Programa de Asistencia al Paciente Advancing Access: <https://www.gileadadvancingaccess.com/financial-support/uninsured>

Para Truvada® y Descovy®

(Si tienes seguro médico no gubernamental)

» Advancing Access: <https://www.gileadadvancingaccess.com/copay-coupon-card>

» O llama al: **1-877-505-6986**

Para Apretude®

» ViiV Connect: <https://www.viivconnect.com/patient/get-savings-information/apretude>

Toma el Control de tu Salud!



Protégete del VIH

Es tan fácil como tomar una pastilla al día o una inyección cada 2 o 6 meses.



¿Sabías?

Aproximadamente 1 de cada 5 nuevos diagnósticos de VIH se da en **mujeres**

No solo los jóvenes están en riesgo: **personas de todas las edades pueden contraer el VIH**

Algunas regiones geográficas de EE. UU., como el sur, tienen **una mayor incidencia de VIH**

¿Dónde puedo obtener PrEP?

<https://pleaseprepme.org/find-a-provider/>
<https://pleaseprepme.org/online-providers/>




PrEP significa profilaxis (pro-fil-lax-sis) preexposición.

Tomar el control. La profilaxis significa tomar medidas para **prevenir una enfermedad o proteger la salud.**



INTEGRITAS
COMMUNICATIONS



Usar condones o tomar un medicamento llamado PrEP puede prevenir que contraigas el VIH.

¿Cómo empiezo la PrEP?

La PrEP es solo para personas que **no tienen VIH**.

Consulta con tu médico para realizarte análisis de sangre y averiguar si la PrEP es adecuada para ti.



¿Cuáles son mis opciones de PrEP?

Hay tres medicamentos diferentes que previenen el VIH.



Dos son pastillas -- **TRUVADA®** y **DESCOVY®** -- y dos son inyecciones -- **APRETUDE®** y **YEZTUGO®**.

Si sientes que corres el riesgo de contraer el VIH solo ocasionalmente, pregúntale a tu médico si la PrEP a demanda es adecuada para ti.

¿Cómo se debe usar la PrEP?

Truvada y Descovy

- Tome su pastilla de PrEP **todos los días**
- Consulte a su médico **cada 3 meses** para hacerse análisis de laboratorio y asegurarse de que no tenga VIH

Apretude

- Consulte a su médico mensualmente durante **los primeros 2 meses** y luego **cada 2 meses** para hacerse análisis de laboratorio y asegurarse de que no tenga VIH y vacunarse

Yeztugo

- Consulte a su médico regularmente para hacerse análisis de laboratorio y asegurarse de que no tenga VIH y vacunarse **cada 6 meses**

No es sólo para personas cuyas parejas sexuales tienen VIH, ni sólo para hombres homosexuales.

¿Es la PrEP todo lo que necesito?

La PrEP es una herramienta importante para protegerte del VIH.

Los condones pueden protegerte de:

- VIH
- ITS (infecciones de transmisión sexual) como sífilis, gonorrea y clamidia
- Embarazo no planificado



¿Qué más debo saber sobre la PrEP?

- **No dejes** que nadie más que nadie más tome sus pastillas de PrEP.
- **Mantenga las pastillas de PrEP en el frasco;** manténgalo cerrado y fuera del alcance de los niños.
- **Tome la pastilla de PrEP todos los días** o inyéctese la inyección cada 2 o 6 meses para prevenir el VIH.
- **Adapte su horario de medicación** a su vida. Incluya la toma de su pastilla de PrEP en las actividades que ya realiza a diario, como cepillarse los dientes o comer.
- **Use un calendario o su teléfono** para recordar su próxima inyección de PrEP o su cita con su médico.



Todos los adultos y adolescentes sexualmente activos deberían considerar la PrEP para prevenir el VIH.